



## Red Fitosanitaria de Aragón

### Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 31

2 de agosto de 2022

### CULTIVOS EXTENSIVOS

## OLEAGINOSAS

### GIRASOL

#### Fenología

El cultivo del girasol se encuentra en plena floración, tanto en las parcelas de Cinco Villas como en la provincia de Teruel.



## **Plagas**

Capturas de *Heliothis* en los puntos de seguimiento de Cinco Villas y Teruel, por encima de las 10 capturas por trampa y semana, umbrales todos ellos por debajo de los de tratamiento. Ausencia del resto de plagas en el cultivo de girasol.

## **FORRAJERAS**

### **Alfalfa**

#### **Fenología**

Cuarto corte ya realizado en algunas zonas, el resto se encuentra a punto de realizarlo en los próximos días.

#### **Plagas**

Pequeño repunte de orugas en las últimas semanas en este cultivo, el repunte ha sido general en todas las zonas, pero por debajo de los umbrales de tratamiento. Presencia de pulgón negro en las zonas de Monegros, Somontano de Barbastro y Ribera Baja del Ebro, obteniendo las máximas capturas en la zona de Barbastro con 70 individuos por pase de manga.

## **CEREAL DE VERANO**

### **MAIZ**

#### **Fenología**


El cultivo se encuentra con el grano lechoso en muchas de las zonas de Aragón. Las variedades de ciclo más corto todavía no han llegado a floración.

#### **Plagas**

Siguen descendiendo las capturas de *Heliothis* (*Heliothis armígera*), llegando a contabilizar por debajo de 40 individuos por trampa en todas las zonas, pero encontrando las primeras plantas afectadas por esta plaga.

Capturas de *Mythinma*, *Ostrinia* y *Sesania* por debajo de los 10 individuos por trampa y semana en las parcelas de seguimiento de todas las zonas.

Primeras semanas en las que se contabiliza presencia de araña roja (*Tetranychus urticae*) en parcelas de seguimiento de Monegros y Ribera Baja del Ebro, con 2 hojas por planta ocupadas y 20 individuos por hoja.



## **ARROZ**

### **Fenología**

Sigue viéndose las primeras plantas en inicio de panícula en la zona del Bajo Cinca, en el resto de las zonas plantas en pleno ahijado.

### **Plagas**

Se sigue con las capturas de *Chilo suppressalis* en las parcelas de seguimiento, llegando a cuantificar 20 individuos por trampa y semana en el Bajo Cinca.

Primeros síntomas de Piricularia en el Bajo cinca, con incidencia de un 2% de las plantas.